

TRATAMIENTO DE PSEUDOARTROSIS DE HUESO GRANDE

García Sánchez, P; Barrio Bernardo-Rua, J; Junquera Méndez, C; Vázquez Prieto, A; Álvarez Álvarez, S
Fundación Hospital de Jove (Gijón).

OBJETIVO

Presentamos el caso de un paciente de 54 años con pseudoartrosis de hueso grande al que previamente se le había realizado una artrodesis total de muñeca y extracción del material un año después de la misma.



MATERIAL Y MÉTODOS

- El paciente había sido intervenido de artrodesis total de muñeca por lesión SLAC como consecuencia de un accidente laboral y, posteriormente, se le realizó la extracción de la placa de artrodesis por molestias con el material. Fue valorado en consulta con diagnóstico de fractura de hueso grande tras traumatismo en mano. Se realizó tratamiento conservador con inmovilización con férula dorsal durante dos meses. Tras ese tiempo y la persistencia de la clínica, se le realizaron TC y RMN.



RESULTADOS

- Se decide realizar intervención quirúrgica: desbridamiento de foco de pseudoartrosis, aporte de injerto autólogo de cresta ilíaca y reartrodesis de muñeca. Se mantiene inmovilización con férula dorsal dos meses.



CONCLUSIONES

- Actualmente, el paciente presenta buena evolución, se aprecia consolidación en los controles radiográficos y no tiene dolor en el foco de fractura.