



TRATAMIENTO DE PSEUDOARTROSIS DE ESCAFOIDES EN VARÓN DE 24 AÑOS

García Sánchez, P; Junquera Méndez, C; Garrido Abres, A; Álvarez Álvarez, S; García García, J
Fundación Hospital de Jove (Gijón).
Hospital Universitario San Agustín (Avilés).

Varón de 24 años con cuadro de dolor en muñeca izquierda. Refiere antecedente de traumatismo hace dos años, mientras jugaba al fútbol. Presenta dolor a la palpación en tubérculo del escafoides, no dolor en tabaquera anatómica y Watson negativo.



Radiografía AP y LAT de muñeca: sospecha de pseudoartrosis de polo proximal de escafoides.
RMN: pseudoartrosis escafoides y signos de necrosis avascular.



Osteosíntesis con injerto libre de radio distal, asistida por artroscopia.

3 meses de inmovilización.

A los nueve meses de la cirugía, el paciente realiza flexión de 80°, extensión de 30° y una pronosupinación normal.

La pseudoartrosis de escafoides no tratada puede conducir a un patrón progresivo predecible de artrosis de muñeca. El tratamiento con injertos óseos es el tratamiento de elección. La artroscopia de muñeca ha dado un paso al frente respecto al diagnóstico y tratamiento de la pseudoartrosis de escafoides.

