

# Tratamiento quirúrgico de lesión lipomatosa de localización atípica.

Comerón Franco, Rubén; Requena Ruiz, Francisco Manuel; Montes Torres, María Cristina

## Objetivos:

Presentar el caso de una paciente con un fibrolipoma en una localización atípica como es la palma de la mano.

## Material y Métodos:

Paciente de 81 años que acude a consulta por la presencia de lipomatosis en mano derecha que afecta a la región tenar, hipotenar y espacio pretendinoso central. La paciente refiere que la presencia de la tumoración palmar le interfiere a la hora de agarrar objetos.

En la RNM realizada se describen con más detalles las lesiones haciendo referencia a la presencia de lipomas intramusculares sobre los músculos de la eminencia hipotenar, entre los tendones flexores del 3º y 4º dedos y desplazando al tendón flexor del dedo gordo, para extenderse distalmente entre el tercer y cuarto dedo al nivel de la falange proximal.

Las dimensiones aproximadas son de 6 cm (CC) x 6 cm (T) x 3 cm (AP).

## Resultados:

Dado el tamaño de las lesiones que presenta, la localización y su interferencia con el desarrollo de sus actividades básicas diarias, se decidió tratamiento quirúrgico mediante exéresis de las tumoraciones descritas.

Tras la cirugía la paciente presentó una buena evolución y durante el seguimiento no presentó recidiva de las lesiones que presentaba inicialmente.

## Conclusiones:

Los lipomas en la palma de la mano son tumores benignos de tejido adiposo que, aunque infrecuentes, pueden presentar características clínicas particulares debido a la complejidad anatómica de esta región. Representan aproximadamente el 16% de los tumores de tejidos blandos en la mano.

Su crecimiento puede provocar síntomas compresivos, afectando estructuras neurovasculares y tendinosas, lo que puede resultar en dolor, parestesias o limitación funcional.

