

Luxación bilateral de hombro tras crisis epiléptica. Diagnóstico y tratamiento

Mínguez Pérez H, Zuil Acosta P, Simón Carrascal A I, Ortiz Pereira P, Ferrete Barroso A M.

Objetivos

Presentar un caso atípico de luxación bilateral de hombro

Material y Metodología

Varón 20 años. Diagnosticado de epilepsia de larga evolución. Presenta crisis tónico-clónica generalizada por lo que acude en ambulancia a urgencias. Tras tratamiento de la misma, se objetiva impotencia funcional de ambos hombros por lo que consulta a Traumatología.



1



2



Resultados

A la exploración física presenta impotencia funcional de ambos hombros y deformidad en charretera en ambos. No presenta alteración neurovascular asociada.

Se realiza radiología simple donde se aprecia luxación glenohumeral anterior de ambos hombros (1).

Se procede a reducción cerrada y se realiza radiografía de control siendo satisfactoria (2).

Se mantiene inmovilizado durante 3 semanas e inicia tratamiento rehabilitador posterior consiguiendo movilidad completa sin dolor pasados 3 meses.

Conclusiones

La luxación de hombro tras crisis epiléptica es una patología descrita en múltiples casos. Aun siendo típica la posterior, la anterior también puede aparecer. Debemos sospechar esta entidad ya que su diagnóstico precoz es fundamental. En este caso se presentó de forma bilateral.